

Commune : Saint-Mamert-du-Gard - Date de visite : 16-07-2014

Nom de la zone humide : Ripisylve du Vallat de la Haute Vérune de la source à Bas Montagnon

Type : ripisylve

Fréquence de submersion :

- Jamais submergé  
 Exceptionnellement  
 Régulièrement  
 Toujours

Etendue de submersion :

- Inconnu  
 Totalement  
 Partiellement

Densité de végétation arborée :  lâche  discontinue  dense  
 Largeur de la ripisylve :  < 3 m  3 à 10 m  10 à 50 m  > 50 m

Evaluation des fonctions et des pressions

Fonction hydrologique/hydraulique :

- > Régulation des crues et des inondations  
 Forme du lit mineur non incisé et absence de berges abruptes

Fonction physique/biogéochimique :

- > Qualité des eaux  
 Présence d'espèces à capacité auto-épuratrice (Phragmites, Typha, Aulne, Frêne)

Fonction biologique/écologique :

- > Etat de conservation des habitats  
 Etat de conservation jugé bon

Pressions exercées au niveau de la zone contributive :

- > Agriculture  
 Présence de cultures annuelles ou temporaires (à moins de 100m)  
 Présence de cultures pérennes - vignes, vergers (à moins de 100m)  
 Traitement de fertilisation et pesticides  
 Problématique liée au bétail (piétinement, surpâturage)  
 Entretien mécanique dégradant (débroussaillage, coupe de ripisylve)  
 Pompage  
 Présence d'une retenue, d'un plan d'eau, d'une gravière

-> Sylviculture

- plantation de résineux ou peupliers

-> Loisirs

- zh empruntée pour accès à une zone de loisir (baignade, pêche, promenade)  
 loisirs motorisés

-> Urbanisation

- Zone urbanisée (route, gazoduc, habitations)  
 Zone de stationnement

-> Autres pressions

- Extraction de matériaux (à moins de 100m)  
 Décharges / remblais  
 Traces de pollutions :  
 Présence d'espèces invasives :

-> Bilan des pressions

- Zone humide fortement contrainte par les pressions

Mémo :

Orientations d'actions :

- Conservation simple (en l'état)  
 Restauration d'une humidité des sols optimale  
 Diversification des milieux  
 Réouverture/gestion de milieux  
 Amélioration de la qualité des eaux  
 Amélioration des connexions avec les milieux annexes  
 Gestion des boisements  
 Autres :

Priorité d'intervention :

- Prioritaire  Secondaire  Pas d'intervention nécessaire

Largeur du lit :

- < 3 m  
 3 à 10 m  
 > 10 m

Hauteur des berges :  < 1 m  < 2 m  > 2 m

Largeur des berges :  < 2 m  2 à 4 m  > 4 m

Cours d'eau canalisé :  oui  non

Canaux et fossés :

- oui  
 non  
 Drainage  
 Irrigation  
 Navigation  
 Autres :

Présence d'ouvrages :

- oui  
 non  
 Barrage  
 Seuil  
 Buse  
 Pont  
 Gué  
 Autres :

Largeur moy. : m

Profondeur moy. : m

Entrée d'eau :

- permanent  
 saisonnier  
 artificielle  
 inconnue  
 cours d'eau  
 canaux/fossés  
 sources  
 nappes  
 plans d'eau  
 ruissellement diffus  
 précipitations

Sortie d'eau :

- permanent  
 saisonnier  
 artificielle  
 inconnue  
 cours d'eau  
 canaux/fossés  
 nappes  
 plans d'eau  
 eaux de crue  
 pompages  
 évaporation

Schéma de connection :

- 1 - traversée  
 2 - entrée et sortie  
 3 - entrée

- 4 - sortie  
 5 - passe à coté  
 6 - aucune connexion

Connexion avec d'autres ZH :

- continue  
 discontinue (+ 30 m)  
 isolée (+ 200 m)

Sol hydromorphe dans les 50 premiers cm :

- oui  
 non

Typologie RhoMeo :

- Bordures de cours d'eau  
 Plaines alluviales  
 Zh de bas-fonds en t?te de BV  
 -> zh d'altitude  
 -> zh de pente et source  
 -> zh de combe/berge  
 Région d'étangs  
 Bordures de plans d'eau  
 -> zh acide  
 -> zh alcaline  
 Marais et landes humides plaines et plateaux  
 -> prairie humide  
 -> pré salé continental  
 Zones humides ponctuelles  
 -> mare temporaire alcaline  
 -> mare temporaire acide  
 -> mare permanente  
 Marais aménagés dans un but agricole  
 Zones humides artificielles

Berges érodées :  oui  non

Aterrissement, galets :  oui  non

Description générale :

De la zone humide :

Ripisylve continue sur berges abruptes de cours d'eau canalisé à écoulement temporaire

De l'espace de fonctionnalité :

Cultures

Habitat

Etat > 50% 20 à 50% < 20%

Galerias de Peupliers provenço-languedociennes

- 





Ripisylve continue en aval de la confluence avec la combe de Cabane.



Ripisylve continue sur cours d'eau canalisé.



## Pédologie :

Id sondage	Type de sol	Sondage	Hydromorphie	Nappe	Commentaire
39	Colluviosol	Négatif	-	-	
117	Colluviosol	Négatif	-	-	

## Espèces caractéristiques :

### Flore

*Aristolochia clematitis*  
**Arundo donax - inv.**  
*Convolvulus sepium*  
*Epilobium hirsutum*  
*Epilobium tetragonum*  
*Fraxinus angustifolia*  
*Helosciadium nodiflorum*  
*Juncus articulatus*  
*Lythrum salicaria*  
*Mentha aquatica*  
*Phalaris arundinacea*  
*Populus alba*  
*Populus nigra*  
*Pulicaria dysenterica*  
*Ranunculus repens*  
*Rumex conglomeratus*  
*Salix alba*  
*Salix purpurea*  
*Samolus valerandi*  
*Scirpoides holoschoenus*  
*Solanum dulcamara*  
*Teucrium scordium*  
*Veronica anagallis-aquatica*

### Faune

## Source des données :

Jean-Laurent Hentz (BE)

## Zone d'inventaire ou de protection :

Cette zone n'est pas incluse dans une zone d'inventaire ou de protection




Localisation de la commune au niveau du bassin versant des Gardons




Fonction hydrologique / hydraulique




Fonction physique / bio-géochimique



Fonction biologique / écologique



Pressions



- ▼ Sondage pédologique caractéristique des zones humides
- Captage d'alimentation en eau potable
- ▼ Sondage pédologique non caractéristique des zones humides
- ⊗ Station d'épuration

