

Commune : Moussac - Date de visite : 18-06-2014

Nom de la zone humide : Ripisylve en paline alluviale vers la Grande Habitarelle

Type : ripisylve

Fréquence de submersion :

- ☒ Jamais submergé  
☐ Exceptionnellement  
☐ Régulièrement  
☐ Toujours

Etendue de submersion :

- ☒ Inconnu  
☐ Totale  
☐ Partiellement

Largeur du lit :

- ☐ < 3 m  
☐ 3 à 10 m  
☐ > 10 m

- Hauteur des berges : ☐ < 1 m ☐ < 2 m ☐ > 2 m  
 Largeur des berges : ☐ < 2 m ☐ 2 à 4 m ☐ > 4 m  
 Cours d'eau canalisé : ☐ oui ☐ non

Canaux et fossés :

- ☐ oui  
☒ non  
☐ Drainage  
☐ Irrigation  
☐ Navigation  
☐ Autres :

Présence d'ouvrages :

- ☐ oui  
☒ non  
☐ Barrage  
☐ Seuil  
☐ Buse  
☐ Pont  
☐ Gué  
☐ Autres :

Largeur moy. : m

Profondeur moy. : m

Entrée d'eau :

- ☐ permanent  
☒ saisonnier  
☐ artificielle  
☐ inconnue  
☐ cours d'eau  
☐ canaux/fossés  
☐ sources  
☒ nappes  
☐ plans d'eau  
☐ ruissellement diffus  
☐ précipitations

Sortie d'eau :

- ☐ permanent  
☒ saisonnier  
☐ artificielle  
☐ inconnue  
☒ cours d'eau  
☐ canaux/fossés  
☐ nappes  
☐ plans d'eau  
☐ eaux de crue  
☐ pompes  
☐ évaporation

Schéma de connexion :

- ☐ 1 - traversée  
☐ 2 - entrée et sortie  
☐ 3 - entrée

- ☒ 4 - sortie  
☐ 5 - passe à coté  
☐ 6 - aucune connexion

Connexion avec d'autres ZH :

- ☒ continue  
☐ discontinue (+ 30 m)  
☐ isolée (+ 200 m)

Sol hydromorphe dans les 50 premiers cm :

- ☐ oui  
☐ non

Typologie RhoMeo :

- ☐ Bordures de cours d'eau  
☒ Plaines alluviales  
☐ Zh de bas-fonds en t?te de BV  
☐ -> zh d'altitude  
☐ -> zh de pente et source  
☐ -> zh de combe/berge  
☐ Région d'étangs  
☐ Bordures de plans d'eau  
☐ -> zh acide  
☐ -> zh alcaline

- ☐ Marais et landes humides plaines et plateaux  
☐ -> prairie humide  
☐ -> pré salé continental  
☐ Zones humides ponctuelles  
☐ -> mare temporaire alcaline  
☐ -> mare temporaire acide  
☐ -> mare permanente  
☐ Marais aménagés dans un but agricole  
☐ Zones humides artificielles

Berges érodées : ☐ oui ☐ non

Aterrissement, galets : ☐ oui ☐ non

Description générale :

De la zone humide :  
 Ripisylve en paline alluviale

De l'espace de fonctionnalité :  
 Cultures et zone urbanisée

Densité de végétation arborée :

- ☐ lâche ☐ discontinue ☐ dense  
 Largeur de la ripisylve : ☐ < 3 m ☐ 3 à 10 m ☐ 10 à 50 m ☐ > 50 m

Evaluation des fonctions et des pressions

Fonction hydrologique/hydraulique :

- > Régulation des crues et des inondations  
☐ Forme du lit mineur non incisé et absence de berges abruptes

Fonction physique/biogéochimique :

- > Qualité des eaux  
☒ Présence d'espèces à capacité auto-épuratrice (Phragmites, Typha, Aulne, Frêne)

Fonction biologique/écologique :

- > Etat de conservation des habitats  
☒ Etat de conservation jugé bon

Pressions exercées au niveau de la zone contributive :

- > Agriculture  
☒ Présence de cultures annuelles ou temporaires (à moins de 100m)  
☒ Présence de cultures pérennes - vignes, vergers (à moins de 100m)  
☒ Traitement de fertilisation et pesticides  
☐ Problématique liée au bétail (piétinement, surpâturage)  
☐ Entretien mécanique dégradant (débranchement, coupe de ripisylve)  
☐ Pompage  
☐ Présence d'une retenue, d'un plan d'eau, d'une gravière

-> Sylviculture

- ☐ plantation de résineux ou peupliers

-> Loisirs

- ☐ zh empruntée pour accès à une zone de loisir (baignade, pêche, promenade)  
☐ loisirs motorisés

-> Urbanisation

- ☒ Zone urbanisée (route, gazoduc, habitations)  
☐ Zone de stationnement

-> Autres pressions

- ☐ Extraction de matériaux (à moins de 100m)  
☐ Décharges / remblais  
☐ Traces de pollutions :  
☐ Présence d'espèces invasives :

-> Bilan des pressions

- ☐ Zone humide fortement contrainte par les pressions

Mémo :

Orientations d'actions :

- ☐ Conservation simple (en l'état)  
☐ Restauration d'une humidité des sols optimale  
☐ Diversification des milieux  
☐ Réouverture/gestion de milieux  
☐ Amélioration de la qualité des eaux  
☐ Amélioration des connexions avec les milieux annexes  
☐ Gestion des boisements  
☐ Autres :

Priorité d'intervention :

- ☐ Prioritaire ☐ Secondaire ☒ Pas d'intervention nécessaire

Habitat

Etat > 50% 20 à 50% < 20%

Galerie de Peupliers provenço-languedociennes

- ☒ ☐ ☐





Bosquet de ripisylve en limite de prairies temporaires fauchées.



Colonisation par les Frênes et les Peupliers vers la Grande Habitarelle.

## Pédologie :

| Id sondage | Type de sol | Sondage | Hydromorphie | Nappe | Commentaire |
|------------|-------------|---------|--------------|-------|-------------|
| 70         | Fluviosol   | Négatif | -            | -     |             |

## Espèces caractéristiques :

### Flore

*Fraxinus angustifolia*  
*Populus alba*  
*Populus nigra*

### Faune

*Milvus migrans* - An.1, F

## Source des données :

Jean-Laurent Hentz (BE)


## Zone d'inventaire ou de protection :

Cette zone n'est pas incluse dans une zone d'inventaire ou de protection





Localisation de la commune au niveau du bassin versant des Gardons





Fonction hydrologique / hydraulique

Fonction physique / bio-géochimique

Fonction biologique / écologique

Pressions



- ▼ Sondage pédologique caractéristique des zones humides
- Captage d'alimentation en eau potable
- ▼ Sondage pédologique non caractéristique des zones humides
- ⊗ Station d'épuration

